## Arbeitsblatt Drohnenvölker Variante 1



Tage vor Besamung	Was ist zu tun
lm März	Drohnenvölker verstärken und mit Blütenhonig füttern.
50	50 Tage vor der Besamung einen Baurahmen mitten ins Brutnest für die Drohnen einhängen. Bei Zugabe einer ausgebauten Drohnenwabe reichen auch 45 Tage vor Besamung. Wichtig ist, alle 3-4 Tage mit Honig + Eiweißfutter bei schlechten Wetter füttern.
40	40 Tage vor Besamung wird der Drohnenrahmen kontrolliert. Wenn genügend Drohnenbrut vorhanden ist, wird der Drohnenrahmen in den Honigraum gehängt. Ein Absperrgitter wird zwischen Brutund Honigraum eingelegt. Bei Drohnen in 12-er MP: DrRa hinter Schied mit AG.
	Bei schlechtem Wetter muss alle 2-3 Tage mit Blütenhonig + Eiweißfutter gefüttert werden, damit die offene Drohnenbrut gut versorgt wird, dies gilt auch, wenn die Drohnen geschlüpft sind.
8	8 Tage vor der Besamung lässt man die Drohnen täglich, bei gutem Wetter, fliegen. Hierfür eignet sich eine Flugvoliere, die dem Drohnenvolk aufgesetzt wird.
1-2	Aufstellung der Drohnenvölker am Ort der Besamung
0	Besamung